

HAKKIMIZDA



1986 yılında veteriner ecza depoculuđu ile çıktığımız yola bugün Kuzey Kıbrısta beşeri ve veteriner ilaçlar, Türkiye’de yem katkı ve premiks üretimiyle ülkemiz insan ve hayvan sađlığına hizmet etmekteyiz.

Sektöre kaliteli, çağdaş, yenilikçi ürünler sunmak her zaman ilk hedefimiz olmuştur. Üretmiş olduğumuz her markadaki , her ürünü bu anlayış ile kullanımınıza sunuyor sizlerle kalıcı dostluklar kurmayı hedefliyoruz.



APİMİX SUPPER-VIT

Kullanım Sahası

Tavuklarda ve kümes hayvanlarında; Herhangi bir nedenle yem tüketiminin azalmış olması yüzünden ortaya çıkmış olan vitamin açığının içme suyu yolu ile telafi edilmesini sağlamaktadır. Kuzu,buzağı,oğlak,tay ve diğer çiftlik hayvanlarında; Sağlıklı gelişme ve hızlı büyümenin sağlanması,gebelik döneminde vitamin noksanlığı çeken analardan doğan yavrularda sütle sağlanamayan vitamin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.Süt emme döneminde vitamin ihtiyaçlarının karşılanması ve iştahsızlık sebebiyle sütle alınamayan vitaminlerin telafisini sağlar.

Kullanım Şekli

İçme sularıyla veya ağız yolundan içirilmek suretiyle kullanılır. 1 Ton içme suyuna 20 g ilave edilir ve sürekli içirilir.

Ambalaj Şekli

1kg' lık plastik bidonlarda takdim edilmiştir. 100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir

Bileşimi

Vitamin A	10.000.000	IU	Vitamin B6	10.000	MG	Kalsiyum-d-pant	20.000	MG
VitaminD3	1.000.000	IU	Vitamin B12	50	MG	Niacin	15.000	MG
VitaminE	10.000	MG	Vitamin C	20.000	MG	Folik Asit	3.000	MG
Vitamin B1	10.000	MG	Vitamin K3	10.000	MG			
Vitamin B2	20.000	MG	Biotin	200	MG			





APİMİX EVİTSEL FORTE

Kullanım Sahası

Civciv, piliç, tavuk, hindi, güvercin gibi kümes hayvanları ve kuzu, oğlak, buzağı gibi çiftlik hayvanlarında görülen zedelenmiş, hasar görmüş kasların onarılması kasların sağlıklı ayakta duramama, çökme, boyunlarını tutamama durumlarında ve E vitamini anti oksidan etkisi nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlenmesi, direncinin artırılması yaşlanmayı geciktirici olarak kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Kümes hayvanlarında 50 Litre içme suyuna 100-150 g. olarak kullanılır. 10 kuzu ve oğlağa 100 g. Sığır ve atlara: 100 g. olarak verilir. Gebeliklerinin son ayına girildiğinde 5 koyun veya keçiye 100 g. olarak temiz su ile 2-3 gün süreyle tekrarlanarak kullanılır.

Ambalaj Şekli

100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir. 1 kg'lık plastik bidonlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin E	30.000	MG
Sodium Selenite :	200	MG





APİMİX

K₃

Kullanım Sahası

Kanatlılarda karşılaşılan vitamin ve amino asit eksiklerinin giderilmesi, yüksek verime yönelik gerekli desteğin sağlanması, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi, gaga kesimi, hava değişikliği ve nakiller gibi stres oluşturan durumların önlenmesi, verim düşüklüğünün önlenmesi, verim artırılması, gelişmenin hızlandırılmasına karşı vücut direncinin artırılması ve bilinmeyen sebeplerden kaynaklanan vitamin ve amino asit kayıplarının karşılanması amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli


Kanatlılarda ve süt emme dönemindeki memeli hayvanlarda içme sularına katılarak veya ağız yolundan içirilerek 3-5 gün süreyle kullanılır. Kanatlı hayvanlarda; 400 litre içme suyuna 100g. (1 poşet) şeklinde kullanılır. Buzağı, kuzu ve oğlaklarda; 10 adet kuzu veya oğlağa günde 1 çay kaşığı (4 g.). 2 adet buzağıya günde 1 çay kaşığı (4g.) şeklinde kullanılabilir.

Ambalaj Şekli

100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir. 1 kg'lık plastik bidonlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	19.000.000	IU
Vitamin K ₃	16.000	MG





APİMİX 711 - FORTE

Kullanım Sahası

Kanatlılar, kuzu ve buzağuların sağlıklı gelişimini ve canlı ağırlık artışını sağlar. Et süt ve yumurta veriminin üst düzeye taşınmasına zemin hazırlar. Erkek damızlıklarda döl veriminin kalitesinin ve aşım oranının artmasında kullanılan toz formda üründür.

Kullanım Şekli

Kanatlılarda:

0-10 günlüklerde :80 g.

10-20 günlüklerde:120 g.

20 gün ve sonrasında 200 g. olarak 1 ton içme suyuna veya yemine ilave edilir.

Kuzu, oğlak ve buzağulara:

10 kg canlı ağırlığa 4 g. olarak suyuna veya yemine ilave edilir.

Ambalaj Şekli

1kg' lık plastik bidonlarda takdim edilmiştir.

100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	6.000.000	IU	Vitamin B6	1.000	MG	Calcium -d-pant	10.000	MG
VitaminD3	500.000	IU	Vitamin B12	10	MG	Niacin	20.000	MG
VitaminE	5.000	MG	Vitamin C	10.000	MG	Methionine	8.000	MG
Vitamin B1	2.000	MG	Vitamin K3	1.000	MG	Folic Acid	1.000	MG
Vitamin B2	3.000	MG	Biotin	50	MG			





APİMİX ACK

Kullanım Sahası

Büyüme, gelişme, gebelik ve yüksek verim aşamasında olan hayvanlarda vitamin desteğinin sağlanması, nakil, aşılama, gaga kesimi, aşırı sıcaklık ve soğukluğa bağlı stres halleri, vücut direncinin artırılması amacıyla destekleyici ve koruyucu olarak kullanılır.

Kullanım Şekli

İçme sularına veya süte katılarak 2-3 gün süre ile verilir. Destekleyici Olarak 20 litre (1 teneke) içme suyuna 1 ölçek (5g) . Sürüde ise 400 litre (2 varil) içme suyuna 100 g.

Ambalaj Şekli

1kg'lık plastik bidonlarda takdim edilmiştir. 100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	30.000.000	IU
Vitamin C	5.000	MG
Vitamin K3	20.000	MG





APIMIX BCK

Kullanım Sahası

Kanatlı, kuzu, oğlak ve buzağılar ile tüm evcil hayvanlarda; adı geçen vitamin eksikliklerinin giderilmesinin desteklenmesini, büyüme ve gelişmenin hızlandırılmasını sağlar.

Kullanım Şekli

İçme sularına 3-5 gün süre ile verilip 3-4 saat içinde tamamen tüketilebilecek içme suyuna konulmalıdır. İçme suyu her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Ambalaj Şekli

1kg'lık plastik bidonlarda takdim edilmiştir.
100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin B1	5.000	MG	Vitamin K3	500	MG
Vitamin B2	1.000	MG	Biotin	50	MG
Vitamin B6	1.000	MG	Kalsiyum-D-Pant	25.000	MG
Vitamin B12	50	MG	Niacin	25.000	MG
Vitamin C	5.000	MG	Folic Acid	10.000	MG





APİMİX DOPHAMİN

Kullanım Sahası

Kümes hayvanlarında; Yemden yararlanmayı artırır. Yumurta kabuğunu güçlendirir. Tüy dökülmesi sonucu vücutta oluşan mineral madde kaybını karşılar. Kuzu ve buzağılarda; Hızlı kilo artışı sağlar. Mineral eksikliğini giderir. Ergin hayvanlarda; Fosfor ve mineral eksikliğini giderir.

Kullanım Şekli

Besi sığırları: :20 ml/100 kg canlı ağırlık/1lt su - **Gebe ve laktasyonda ki sığırlar** :30ml/100 kg canlı ağırlık/1lt su
Buzağılar, gebe süt veren koyun ve keçi : 15ml/0.5lt su **Kuzu ve oğlaklar** : 5ml/2 bardak su
Tavuk ve Hindiler :2,5-5lt/ton içme suyuna(1000 tavuk için içme suyuna günde 0,5-1lt)
Civciv ve piliçler :1-2lt/ton içme suyuna (1000 civciv veya piliç için içme suyuna günde 0,5-1lt)
Dophamin Oral Çözelti, evcil hayvanların içme sularına her gün taze olarak katılmak suretiyle oral yolla kullanılır.

Ambalaj Şekli

1-2,5-5-10 ve 25 kg plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Fosfor	75.000	MG	Mangan	1.000	MG	Lizin	7.000	MG
Kalsiyum	37.000	MG	Çinko	1.000	MG	Biotin	200	MG
Sodyum	2.000	MG	Bakır	500	MG	Folik Asit	300	MG
Potasyum	1.000	MG	Kobalt	700	MG	Choline Chloride	270	MG
Demir	2.000	MG	Selenyum	10	MG			
Magnezyum	4.000	MG	Metiyonin	15.000	MG			





APİMİX AD₃ EC VİT

Kullanım Sahası

Kümes hayvanlarına ve çiftlik hayvanlarında aşılama sırasında oluşan stresin önlenmesinde kemik yapısının ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, gaga kesimi, metabolizma bozukluğu gibi rahatsızlıkların giderilmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Kanatlılarda 1 ton içme suyuna:

01-10 günlüklere 200 ml

10-20 günlüklerde 250 ml

20 gün sonrası 300 ml

Kuzu ve buzağılarda 10 lt içme suyuna:

5 ml hesabıyla kullanılır.

Ambalaj Şekli

1000 ml plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	30.000.000	IU
VitaminD ₃	5.000.000	IU
VitaminE	30.000	MG
Vitamin C	100.000	MG





APİMİX MAXİ - VİT

Kullanım Sahası

Civciv, piliç, tavuk, hindi, güvercin, koyun, keçi, buzağı, inek ve at gibi hayvanların kemik yapısının ve bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde damızlık hayvanlarda döl ve yumurta veriminin artırılmasında böylece dişi hayvanların gebe kalma oranının yükseltimin de kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Tavuk ve Hindiler: 1.500 litre içme suyuna 1 kg. **Civciv ve Piliç:** 3 ton içme suyuna 1 kg.

Besi sığırlar için: 20ml **Süt sığırları için:** 30ml **Buzağı, Koyun, Keçi için:** 15ml

Kuzu, Oğlaklar için: 10ml içme suyuna karıştırılarak 5-6 gün verilir.

Maxi Vit her gün taze su ile verilmelidir.

Ambalaj Şekli

1000 ml plastik ambalajlarda takdim edilmiştir

Bileşimi

Vitamin A	13.500.000	IU	Fosfor	75.000	MG	Folik Asit	250	MG
VitaminD3	200.000	IU	Sodyum	2.00	MG	Vitamin B12	15	MG
Vitamin E	8.000	MG	Potasyum	1.000	MG	Kalsiyum	37.000	MG
Vitamin B1	2.000	MG	Demir	2.000	MG	Niacin	100.000	MG
Vitamin B2	1.500	MG	Magnezyum	4.000	MG	Choline Chloride	30	MG
Vitamin B6	1.000	MG	Mangan	1.000	MG	Metiyonin	15.000	MG
Vitamin C	20.000	MG	Çinko	1.000	MG	Bakır	500	MG
Vitamin K3	1.000	MG	Kobalt	750	MG	Selenyum	10	MG
Biotin	30	MG	Lizin	8.500	MG			





APİMİX E-SELEN-YUM

Kullanım Sahası

Civciv,piliç,tavuk,hindi,güvercin gibi kümes hayvanları ve kuzu,oğlak,buzağı gibi çiftlik hayvanlarında görülen zedelenmiş,hasar görmüş kasların onarılması kasların sağlığı ayakta duramama,çökme,boyunlarını tutamama durumlarında ve E vitamini anti oksidan etkisi nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlenmesi,direncinin artırılması ve yaşlanmayı geciktirici olarak kullanılabilir.

Kullanım Şekli


Kanatlılarda 100. ltiçme suyuna 50 ml. at,sığır,koyun ve keçilerde 50 kg. ağırlığa 8 ml. kuzu,buzağı oğlaklarda 20 kg. ağırlığa 3 ml. 2-3 gün aralıklı olarak temiz suyla kullanılır.

Ambalaj Şekli

1-2,5-5-10 ve 25 kg plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin E	20.000	MG
Sodyum selenite	200	MG
Bakır sülfat	30	MG





APİMİX MENT - AIR



Kullanım Sahası

Ment-air solunum yolu fonksiyonlarının düzenlenmesinde,aşırı sıcak ortamlarda aşılama döneminde oluşan stresin atılmasında ve ferahlatıcı özelleğiyle nefes alıp vermenin düzenlenmesinde yardımcı olmada kullanılır.

Kullanım Şekli

1 ton temiz günlük içme suyuna 250 gr. Şekli ile sabah akşam uygulanmalıdır.pulverize şekilde sırt pompasına 10 lt. temiz suya 250 gr. ilave edilir.Pompanın uç kısmı yukarı bakacak şekilde de uygulanabilir.

Ambalaj Şekli

1-2,5-5-10 VE 25 kg. plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Mentol	8	MG
Okaliptus	80	MG
Kekik	40	MG



APİMİX VİTAMİN C

Kullanım Sahası

Vitamin C ihtiyacının karşılanması ve büyümede, gelişmede destekleyici olarak kanatlılarda yumurta kabuğunun kuvvetlendirilmesinde kalsiyum ve birçok minerallerinin arttırılmasına yardımcı olur.

Kullanım Şekli


1 ton içme suyuna 300 g. olarak her gün taze hazırlanmış suya katılarak 2-3 saat içinde tüketilmelidir.

Ambalaj Şekli

1-2,5-5,10 ve 25 kg'lık plastik ambalajlarda takdim edilmiştir

Bileşimi

Ascorbik asit (%99,5)	49.000	MG
-----------------------	--------	----





APİMİX

APİMEX

Kullanım Sahası

Sığır, koyun, keçilerde karbonhidrat ve protein tüketimine bağlı ani rasyon değişikliklerinden kaynaklanan sindirim bozuklukları mikroflorasının bozulmasıyla sonuçlanan rumenal sindirim bozukluklarının sağaltımını ayrıca iştahsızlık, hazımsızlık durumlarının genç ruminantlarda ve besi sığırlarındaki yemden yararlanma canlı ağırlık artışının sağlanması amacıyla kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Sığırlara günde 125 gr'lık bir poşet ,koyun ve keçilerde 25-30 g. miktarında verilir.Hayvan başına 1-2 litre temiz içme suyuna karıştırılarak günde 1 kere verilmelidir.

Ambalaj Şekli

Sığırlara günde 125 gr'lık bir poşet ,koyun ve keçilerde 25-30 g. miktarında verilir.Hayvan başına 1-2 litre temiz içme suyuna karıştırılarak günde 1 kere verilmelidir.

Bileşimi

Kalsiyum propiyonat	50	G	Bakır	%3	
Gentian	5	MG	Demir	%5	
Sacharomyces cerevisiae (Canlı maya hücresi)	(%15)	MG	Kobalt	%0.7	
Sorbitol	7	G	Asetil metiyonin	5	MG
Mangan	%3.5		Colloidal silica	%3	
Çinko	%3.5		Kalsiyum karbonat q.s.p.	125	G





APİMİX

710

Kullanım Sahası

Kanatlı ve ruminant gibi hayvanlarda sürü sağlığının korunması verimliliğin artırılması ve vitamin eksikliğinin giderilmesi amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli

Tüm kanatlı ve ruminantların içme suyuna ve yemlerine katılarak kullanılır.

Kanatlılarda:

0-10 günlüklere: 80 g.

10-20 günlüklere: 120 g.


20 gün sonrasına: 180 g. olarak kullanılır.

Ambalaj Şekli

100 g. x 10 adet alüminyum poşetlerde kutulu olarak takdim edilmiştir. 1 kg'lık plastik bidonlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin A	20.000.000	IU
Vitamin E	12.000	MG
Vitamin D3	50.000	IU





APİMİX BAKİRSEL

Kullanım Sahası

Kobalt eksikliklerinde, beyaz kas ve kemik bozukluklarına bağlı hareket bozukluklarına , gebelik sonlanmalarına ve ölü veya zayıf yavru doğumlarına karşı takviye amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli

Kuzu-Oğlak: Doğumun 2.gününde 1-2 tablet, 1 Hafta sonra 1-2 tablet,

Buzağı: Doğumun 2.gününde 3 tablet, 1 Hafta sonra 3 tablet,

Koyun-Keçi: Koç katımından 1 ay önce 2 tablet, Gebeliğin 3.ayından sonra 2 gün günde 1-2 tablet,

Besi Danaları: 3 ayda bir 2 tablet,

İnekler: Çiftleşmeden 1 ay önce 3-4 tablet, Gebeliğin 5.ayından sonra 2 gün günde 3-4 tablet

Ambalaj Şekli

50 tabletlik plastik ambalajlarda kutulu olarak takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin E	600	MG	Bakır sülfat	10	MG
Çinko	12.5	MG	Kobalt sülfat	12.5	MG
Sodyum selenit	2.75	MG	Dikalsiyum fosfat	150	MG





APİMİX ELEKTROMYCİN

Kullanım Sahası

Tüm hayvan türlerinde çeşitli nedenlere bağlı ishal, inatçı kusma gibi durumlarında oluşan sıvı -elektrolitlerin kayıplarının yerine konulmasında ve enerjini desteklenmesinde kullanılır.

Kullanım Şekli


Buzağı ve kuzular:50 kg canlı ağırlık için 50-100 g. ELEKTOMYCİN ORAL ÇÖZELTİ TOZU (POŞET A+B) 2 litre ılık suda eritilir. Taylarda ve atlarda: 50 kg canlı ağırlık için 50-100 g. ELEKTOMYCİN ORAL ÇÖZELTİ TOZU (POŞET A+B) 2 litre ılık suda eritilir. Kanatlılarda:200 litre içme suyuna 100 g.'lık ELEKTOMYCİN ORAL ÇÖZELTİ TOZU (POŞET A+B), 1 ton içme suyuna 500 gram ELEKTOMYCİN ORAL ÇÖZELTİ TOZU(5 ADET POŞET A VE 5 ADET POŞET B) katılır. Uygulamaya 5-7 gün devam edilir.

Ambalaj Şekli

Kutu içerisinde 1 adet 25 kg'lık alüminyum folyo poşet A ve 1 adet 75 kg'lık alüminyum folyo poşet B olarak takdim edilmiştir.

Bileşimi

Kolin Klorid	1.1	GR	Magnezyum Asetat	1.5	GR
Sodyum Klorid	2.5	GR	Glisin	3.0	GR
Potasyum Klorid	2.5	GR	Sodyum Bikarbonat	5	GR
Sodyum Sitrat	5.5	GR	Glukoz Monohidrat	75	MG
Sodyum Asetat	1.	GR			





APİMİX MENT - AİR

Kullanım Sahası

İştah arttırıcı, gaz giderici, balgam söktürücü, kabızlık ve hazımsızlık giderici olarak kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Sığır ve Atlarda: 80-100 g.

Koyun ve Keçilerde: 15-20 g.

Kedi ve Köpeklerde: 5-10 g.


ılık su ile karıştırılarak iyice eritilir ve ağız yoluyla içirilir.

Ambalaj Şekli

100-250-500 g'lık aliminyum ambalajlarda ve 5-10-25 kg'lık kraft torbalarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Sodyum Sülfat	440	MG
Sodyum Klorür	360	MG
Sodyum Bikarbonat	200	MG





APİMİX

E-SELEN-YUM POWDER

Kullanım Sahası

Civciv,piliç,tavuk,hindi,güvercin gibi kümes hayvanları ve kuzu,oğlak,buzağı gibi çiftlik hayvanlarında görülen zedelenmiş,hasar görmüş kasların onarılması kasların sağlığı ayakta duramama,çökme,boyunlarını tutamama durumlarında ve E vitamini anti oksidan etkisi nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlenmesi,direncinin arttırılması ve yaşlanmayı geciktirici olarak kullanılabilir.

Kullanım Şekli


Kanatlılarda 100. ltiçme suyuna 50 ml. at,sığır,koyun ve keçilerde 50 kg. ağırlığa 8 ml. kuzu,buzağı oğlaklarda 20 kg. ağırlığa 3 ml. 2-3 gün aralıklı olarak temiz suyla kullanılır.

Ambalaj Şekli

1-2,5-5-10 ve 25 kg plastik ambalajlarda takdim edilmiştir.

Bileşimi

Vitamin E	20.000	MG
Sodyum selenite	200	MG
Bakır sülfat	30	MG



Tarih: / /



Görüş, Öneri, Şikayet ve Taleplerinizi yanda bulunan formu doldurarak kurumumuza iletebilirsiniz.

You can forward your requests, opinions, suggestions, complaints to our company by filling in the form on the side.



Adres/Address :

Apex İlaç Yem Yem Katkı
Premiks Tic. ve San. Ltd . Şti.
Özsan sanayi sitesi
20.Blok No:3
Malatya/Türkiye

E-Mail :

info@apimixilac.com

Telefon No / Telephone

Number :

+90 422 321 13 33

ÖNERİ / PROPOSAL

Ürün Adı / Product Name

Öneri veya Şikayetiniz / Suggestions or Complaints

Firma Adı / Company Name

Adres / Address

Telefon No / Phone Number

E-Mail





Özsan Sanayi Sitesi 20.Blok No:03 Yeşilyurt/MALATYA
+90 422 321 13 33
info@apimixilac.com

www.apimixilac.com